

ロング法

前周期の基礎体温高温相7日目前後*2から点鼻薬*1を開始
予約項目『薬(ピルOC以外)』

ブセレキユア

1日 4回 片鼻
(1日合計 4回スプレー)

他の薬剤を使用する場合は使用方法を確認してください
採卵前々日のオビドレル皮下注射前まで継続します

オビドレル皮下注射(採卵の36時間前)
自己注射

月 日() :

この注射以降、点鼻薬は使用しません。

×××××
生理



月経3~6日目に来院
(ホルモン検査、超音波検査)
予約項目『先採血+ART卵胞
チェック』

卵巣刺激のための注射
オビドレル皮下注射当日もしくは前日まで、連日続きます

連日注射の期間中、数日おきに診察・採血があります
予約項目『先採血+ART卵胞チェック』もしくは『ART卵胞
チェック』(医師・看護師・培養士から指示があります)

採卵
(予約はこちらでお取りします)
来院時間 月 日()
:

*1: スプレキユア、ブセレキユア、ナサニール、ナファレリールなど。使用回数は種類により異なりますので、必ず回数を確認してください。
*2: 基礎体温の上昇が分かりにくい方は月経開始21日目より始めてください。

- 採卵前に必ず確認してください
- ・ ART説明は受けられましたか？
 - ・ 術前検査は済まされていますか？
 - ・ 同意書4枚は提出されましたか？
 - ・ ご主人の検体を入れる容器はお手元にありますか？